Nimi: Clostridioides difficile ripulia sairastavan asukkaan hoito ympärivuorokautisessa palveluasumisessa
Versio: 8
Yksilöllinen tunniste: WEB-8892-56076-fi
Laatija: Kangaslaakso, Minna
Hyväksyjä: Ville Lehtinen, 30.3.2026 15:03
Voimassaoloaika: 30.3.2027
Ohjetyyppi: TOIMINTAOHJE

CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE RIPULIA SAIRASTAVAN ASUKKAAN HOITO

Clostridioides difficile on ripulia ja paksunsuolentulehdusta aiheuttava, itiöitä muodostava suolistobakteeri.

Henkilöt jotka ovat saaneet pitkään laajakirjoista mikrobilääkehoitoa on riski sairastua *C. difficile* -ripuliin. Mikrobilääkkeet muuttavat tai vahingoittavat suoliston normaalia bakteerikasvustoa.

Tartunta saadaan *C. difficile* -bakteerin itiöistä, jotka säilyvät hengissä myös elimistön ulkopuolella erilaisilla pinnoilla. Käsien välityksellä itiöt kulkeutuvat suun kautta suolistoon ja alkavat lisääntyä.

Hoitolaitoksissa itiöt voivat levitä myös asukkaasta toiseen kosketustartuntana käsien välityksellä.

Clostridioides difficilen hoito ja leviämisen torjunta

- Oireilevasta asukkaasta otetaan ulostenäyte **F-BaktNhO 23458** ja aloitetaan **kosketusvarotoimet**
- Tehostetaan käsihygieniaa: käsien pesu saippualla, hyvä kuivaus ja desinfiointi
- Kosketusvarotoimet voidaan purkaa, kun asukas on ollut 2 vuorokautta oireeton
- Likapyykki on infektiopyykkiä
- Toiminnassa huomioidaan aseptinen työjärjestys
- Erillinen siivousohje: tarttuvat ripulitaudit Clostridioides difficile ja Noro
- Jos asukas liikkuu huoneensa ulkopuolella, tehostetaan yleisten tilojen kosketuspintojen siivousta
- Seurantanäytteitä ei oteta

.