Nimi: Norovirusripulia sairastavan asukkaan hoito ympärivuorokautisessa palveluasumisessa
Versio: 6
Yksilöllinen tunniste: WEB-8593-56035-fi
Laatija: Mölsä, Sari
Hyväksyjä: Ville Lehtinen, 30.3.2026 15:04
Voimassaoloaika: 30.3.2027
Ohjetyyppi: TOIMINTAOHJE

NOROVIRUSRIPULIA SAIRASTAVAN ASUKKAAN HOITO

Norovirus on yleisimpiä vatsatautien aiheuttajia ja erittäin herkästi tarttuva.

Tartunta voi tapahtua suoraan henkilöstä toiseen kosketustartuntana, veden tai elintarvikkeiden välityksellä, kosketuspintojen kautta tai aerosolitartuntana oksenteluun liittyen.

Taudin itämisaika on 12-48 tuntia.Oireet kestävät tyypillisesti 12-72 tuntia.

Noron leviämisen torjunta

- Oireilevasta asukkaasta otetaan ulostenäyte (F-NoroNho 4940) ja aloitetaan kosketusvarotoimet
- Jos yksikössä on useita samankaltaisesti oireilevia asukkaita samaan aikaan, suosittellaan, että 3–5 oireilevaa asukasta testataan epidemian aiheuttajan tunnistamiseksi
- Tehostetaan käsihygieniaa: käsien pesu saippualla, hyvä kuivaus ja desinfiointi
- Likapyykki on infektiopyykkiä:
    - pestään omassa yksikössä: pyykki pestään 60 asteen lämpötilassa. Jos vaatteille suositellaan alhaisempaa lämpötilaa, niin pyykkipulverin lisäksi käytetään pyykin desinfektiojauhetta (Erisan Oxy+) ohjeen mukaisesti. pyykkihuolto
- Suositellaan henkilökunnan kohortointia
- Toiminnassa huomioidaan aseptinen työjärjestys
- Siivousta tehostetaan
    - Asukashuoneessa kosketuspintojen siivouksessa asukkaan kosketusvarotoimien ajan
    - Yleisten tilojen kosketuspintojen siivouksessa
- Erillinen siivousohje: Tarttuvat ripulitaudit Clostridioides difficile ja noro

Muuta huomioitavaa

Epidemiatilanteissa sairastuneista asukkaista ja työntekijöistä pidetään seurantalistaa. Tilannearvio ilmoitetaan hygieniahoitajalle päivittäin.

Kosketusvarotoimet voidaan purkaa, kun asukkaan viimeisistä oireista on kulunut 48 h.

Sairastunut työntekijä voi palata töihin, kun viimeisistä oireista on kulunut 48 h.